ThickenUP® clear *ha dimostrato:*

una riduzione statisticamente significativa del numero di aspirazioni rispetto agli altri addensanti[4]

Fig.3 *Prevalenza % degli episodi di aspirazione misurati con VFS*



Grazie alla gomma di Xanthan che aumenta la viscosità del bolo Resource ThickenUp Clear ha dimostrato una migliore sicurezza della deglutizione, riducendo il numero delle aspirazioni (scala PAS).

4. Leonard RJ, White C, McKenzie S, Belafsky PC. J Acad Nutr Diet. 2014;114(4):590-4

ThickenUP® clear

Sicurezza clinicamente dimostrata:

Resource ThickenUp Clear
L'unico addensante sicuro, efficace e ben tollerato[2,3], supportato da evidenze cliniche che ha dimostrato di

RIDURRE:

- i sintomi della tosse e le alterazioni della voce[1]
- i residui di cibo dal cavo orale e faringeo[2]
- il numero di aspirazioni che provocano polmoniti ab ingestis[1,4]

Un'unica scelta per addensare

Bibliografia:

1. *Herentry K, et al. Performance-based preference for a novel xanthan gum-based thickener among clinicians treating dysphagia patients.- Poster presentation clinical area. European Geriatric Medicine. 2011;2(S24-S206.)*
2. *Vilardell N, Rofes L, Arreola V, Speyer R, Clavé P - Dysphagia 2016; 31(2):169-79*
3. *Hibberd. - Dysphagia 2011;26:432–475.*
4. *Leonard RJ, White C, McKenzie S, Belafsky PC.- J Acad Nutr Diet. 2014;114(4):590-4*

Nestlé Health Science

www.nestlehealthscience.it
www.nutritionalacademy.it

Nestlé Italiana S.p.A - Nestlé Health Science - Via del Mulino, 6 - 20057 ASSAGO (MI)

Materiale destinato a Sigg. Medici ed Operatori Sanitari - Cod. 4631511 - Giugno 2020

ThickenUP® clear

L'unico addensante supportato da evidenze cliniche

- Eccellente Compliance del paziente[1]
- Viscosità stabile e uniforme nel tempo[1]
- Riduzione dei fenomeni di aspirazione[1,4]

Nestlé Health Science

ThickenUP® clear *ha dimostrato:*

1. Eccellente compliance[1]

- **Inodore Insapore**
- **Consistenza inalterata con liquidi diversi**
- **Totalmente trasparente in acqua**

Il **98%** dei professionisti sanitari afferma che TUC aiuti a migliorare la compliance del paziente con problemi di deglutizione

2. Facile da preparare[1]

- **Si dissolve rapidamente in tutti i liquidi**
- **La stessa quantità di addensante per ottenere lo stesso livello di viscosità in tutti i liquidi**

L'**80%** dei professionisti sanitari preferiscono TUC per la semplicità di preparazione assicurando la consistenza più adatta al paziente

3. Migliore sicurezza nella deglutizione[1]

- **Viscosità uniforme e stabile nel tempo**
  - Forma un bolo senza residui
  - Resiste all'amilasi
- **Minori fenomeni di aspirazione**

L'**80%** dei professionisti sanitari preferisce TUC rispetto agli altri addensanti

1. Herentry K, et al. Performance-based preference for a novel xanthan gum-based thickener among clinicians treating dysphagia patients. Poster presentation clinical area. European Geriatric Medicine. 2011;2(S24-S206.)

Sicuro ed efficace nella gestione della disfagia anche nei pazienti post ictus[2]

Fig.1 *Prevalenza della disfagia nei pazienti post-ictus con sintomi clinici di problemi di sicurezza nella deglutizione e prevalenza della sicurezza nella deglutizione per volume,viscosità e addensante.*
***P\0.01, ***P\0.001 versus sciroppo*



Rispetto agli addensanti tradizionali

ThickenUP® clear *ha dimostrato:*

- una riduzione statisticamente significativa dei sintomi della tosse e delle alterazioni della voce (V-VST Test) (Fig. 1)
- un significativo incremento del livello di sicurezza nella deglutizione (Fig. 1)

2. Vilardell N, Rofes L, Arreola V, Speyer R, Clavé P - Dysphagia 2016; 31(2):169-79

Fig.2 *Prevalenza della disfagia nei pazienti post-ictus con segni VFs di problemi di efficacia della deglutizione per volume,viscosità e addensante.*[2]
**P\0.05, **P\0.01 versus sciroppo*



- una riduzione del residuo orale, del residuo faringeo e della deglutizione frazionata (Fig.2)

ThickenUP® clear *ha dimostrato:*

di essere ben tollerato e accettato dai pazienti con disfagia[3]

Il **94%** dei pazienti hanno espresso un elevato livello di accettazione del liquido addensato con TUC (Massimo rating della scala di accettazione proposta)

L'**86%** dei pazienti ha consumato più del 75% di tutti i liquidi addensati offerti

Nessun sintomo di intolleranza GI è stato riscontrato nei pazienti sottoposti allo studio osservazionale

3. Hibberd. Dysphagia 2011;26:432–475.